

**Vom Gemeinsamen Bundesausschuss als uneingeschränkt zur Veröffentlichung geeignet bewertete Qualitätsindikatoren (im Qualitätsbericht Kategorie C-1.2A)**

| Versorgungsbereich                       | Qualitätsindikator   | Kennzahl-Nr.             |
|--|--|--------------------------|
| Cholezystektomie                         | Präoperative Diagnostik bei extrahepatischer Cholestase  | 2006/12n1-CHOL/44783     |
|  | Erhebung eines histologischen Befundes   | 2006/12n1-CHOL/44800     |
|  | Reinterventionsrate  | 2006/12n1-CHOL/44927     |
| Geburtshilfe                             | Antenatale Kortikosteroidtherapie: bei Geburten mit einem Schwangerschaftsalter von 24+0 bis unter 34+0 Wochen unter Ausschluss von Totgeburten und mit einem präpartalen stationären Aufenthalt von mindestens zwei Kalendertagen | 2006/16n1-GEBH/49523     |
|  | E-E-Zeit bei Notfallkaiserschnitt  | 2006/16n1-GEBH/68383     |
|  | Anwesenheit eines Pädiaters bei Frühgeborenen  | 2006/16n1-GEBH/737       |
| Gynäkologische Operationen               | Antibiotikaprophylaxe bei Hysterektomie  | 2006/15n1-GYN-OP/47637   |
|  | Thromboseprophylaxe bei Hysterektomie  | 2006/15n1-GYN-OP/50554   |
| Herzschrittmacher-Implantation           | Leitlinienkonforme Indikationsstellung bei bradykarden Herzrhythmusstörungen   | 2006/09n1-HSM-IMPL/9962  |
|  | Leitlinienkonforme Systemwahl bei bradykarden Herzrhythmusstörungen  | 2006/09n1-HSM-IMPL/75973 |
|  | Leitlinienkonforme Indikationsstellung und leitlinienkonforme Systemwahl bei bradykarden Herzrhythmusstörungen   | 2006/09n1-HSM-IMPL/76124 |
|  | Perioperative Komplikationen: chirurgische Komplikationen  | 2006/09n1-HSM-IMPL/11255 |
|  | Perioperative Komplikationen: Sondendislokation im Ventrikel   | 2006/09n1-HSM-IMPL/11265 |
|  | Perioperative Komplikationen: Sondendislokation im Vorhof  | 2006/09n1-HSM-IMPL/11264 |
| Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation      | Reinterventionen wegen Komplikation  | 2006/17n2-HÜFT-TEP/45059 |
|  | Endoprothesenluxation  | 2006/17n2-HÜFT-TEP/45013 |
|  | Postoperative Wundinfektion  | 2006/17n2-HÜFT-TEP/45108 |
| Karotis-Rekonstruktion                   | Indikation bei asymptomatischer Karotisstenose   | 2006/10n2-KAROT/9556     |
|  | Indikation bei symptomatischer Karotisstenose  | 2006/10n2-KAROT/9559     |
|  | Perioperative Schlaganfälle oder Tod risikoadjustiert nach logistischem Karotis-Score I: Risikoadjustierte Rate nach logistischem Karotis-Score I  | 2006/10n2-KAROT/68415    |
| Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation | Reinterventionen wegen Komplikation  | 2006/17n5-KNIE-TEP/45059 |
|  | Postoperative Wundinfektion  | 2006/17n5-KNIE-          |

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
|   |   | TEP/47390                |
| Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) | Indikation zur Koronarangiographie - Ischämiezeichen  | 2006/21n3-KORO-PCI/43757 |
|   | Indikation zur PCI  | 2006/21n3-KORO-PCI/69889 |
|   | Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI: Alle PCI mit Indikation akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebung bis 24 h | 2006/21n3-KORO-PCI/69891 |
| Koronarchirurgie, isoliert                                  | Letalität: Risikoadjustierte In-Hospital-Letalität nach logistischem KCH-SCORE  | 2006/HCH-KCH/66781       |
| Mammachirurgie  | Postoperatives Präparatröntgen  | 2006/18n1-MAMMA/46200    |
|   | Hormonrezeptoranalyse   | 2006/18n1-MAMMA/46201    |
|   | Angabe Sicherheitsabstand: bei brusterhaltender Therapie  | 2006/18n1-MAMMA/68098    |
|   | Angabe Sicherheitsabstand: bei Mastektomie  | 2006/18n1-MAMMA/68100    |

**Vom Gemeinsamen Bundesausschuss eingeschränkt zur Veröffentlichung empfohlene Qualitätsindikatoren / Qualitätsindikatoren mit eingeschränkter methodischer Eignung (im Qualitätsbericht Kategorie C-1.2B)**

| Versorgungsbereich             | Qualitätsindikator   | Kennzahl-Nr.                  |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| Ambulant erworbene Pneumonie   | Erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie  | 2006/Pneu/68123               |
|                                | Antimikrobielle Therapie   | 2006/Pneu/68897               |
|                                | Bestimmung der klinischen Stabilitätskriterien   | 2006/Pneu/68914               |
|                                | Klinische Stabilitätskriterien   | 2006/Pneu/68138               |
| Pflege:<br>Dekubitusprophylaxe | Dekubitusprophylaxe bei hüftgelenknaher Femurfraktur: Veränderung des Dekubitusstatus während des stationären Aufenthalts bei Patienten, die ohne Dekubitus aufgenommen wurden: Patienten mit Dekubitus (Grad 1 bis 4) bei Entlassung    | 2006/DEK-17n1-HÜFT-FRAK/48915 |
|                                | Dekubitusprophylaxe bei hüftgelenknaher Femurfraktur: Veränderung des Dekubitusstatus während des stationären Aufenthalts bei Patienten, die ohne Dekubitus aufgenommen wurden: Patienten mit Dekubitus Grad 2 oder höher bei Entlassung | 2006/DEK-17n1-HÜFT-FRAK/50656 |
|                                | Dekubitusprophylaxe in der Herzchirurgie: Veränderung des Dekubitusstatus während des stationären Aufenthalts bei Patienten, die ohne Dekubitus aufgenommen wurden: Patienten mit Dekubitus (Grad 1 bis 4) bei Entlassung                | 2006/DEK-HCH/48915            |
|                                | Dekubitusprophylaxe in der Herzchirurgie: Veränderung des Dekubitusstatus während des stationären Aufenthalts bei Patienten, die ohne Dekubitus aufgenommen wurden: Patienten mit Dekubitus Grad 2 oder höher bei Entlassung             | 2006/DEK-HCH/50656            |
|                                | Dekubitusprophylaxe bei elektiver Endoprothetik von Knie und Hüfte: Veränderung des Dekubitusstatus während des stationären Aufenthalts bei Patienten, die ohne Dekubitus aufgenommen wurden:  | 2006/DEK-ORTHO/48915          |

|              |  |                          |
|--------------|--|--------------------------|
|              | Patienten mit Dekubitus (Grad 1 bis 4) bei Entlassung<br><br>Dekubitusprophylaxe bei elektiver Endoprothetik von Knie und Hüfte:<br>Veränderung des Dekubitusstatus während des stationären<br>Aufenthalts bei Patienten, die ohne Dekubitus aufgenommen wurden:<br>Patienten mit Dekubitus Grad 2 oder höher bei Entlassung | 2006/DEK-<br>ORTHO/50656 |
| Geburtshilfe | Azidose bei reifen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung   | 2006/16n1-<br>GEBH/811   |