

Präoperative Diagnostik

	Gesamt 2004		Gesamt 2003	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Führender EKG-Befund zur Schrittmacherindikation				
kein führender EKG-Befund	369	0,59	524	1,01
AV-Block I	324	0,52	314	0,60
AV-Block II Wenckebach	1.134	1,82	877	1,69
AV-Block II Mobitz	5.924	9,50	4.930	9,50
AV-Block III	13.761	22,06	11.836	22,80
bifaszikulärer Block	731	1,17	591	1,14
Sinusknoten-Syndrom (SSS)	15.930	25,54	12.447	23,98
Bradykardie-Tachykardie-Syndr. (BTS)	8.586	13,76	7.451	14,36
bradykardes Vorhofflimmern	11.403	18,28	9.175	17,68
Karotissinussyndrom (CSS)	1.170	1,88	1.149	2,21
Vasovagales Syndrom (VVS)	98	0,16	110	0,21
binodale Erkrankung	1.280	2,05	1.060	2,04
Sonstiger führender EKG-Befund	1.672	2,68	1.440	2,77
Häufigkeit des Auftretens				
häufig/permanent	42.157	67,58	34.234	65,96
selten/intermittierend	19.856	31,83	17.146	33,03
Zusätzliche Angaben				
Provokationstest	2.165 / 62.382	3,47	2.126 / 51.904	4,10
Wenn Provokationstest:				
Ergebnis des Provokationstests				
Keine Rhythmusstörung	284 / 2.165	13,12	262 / 2.126	12,32
Sinusknotenerholungszeit (SKEZ) pathologisch	268 / 2.165	12,38	280 / 2.126	13,17
Wenckebachpunkt pathologisch	228 / 2.165	10,53	214 / 2.126	10,07
SKEZ und Wenckebachpunkt pathol.	108 / 2.165	4,99	100 / 2.126	4,70
Karotissinusmassage pathologisch	1.038 / 2.165	47,94	1.035 / 2.126	48,68
Kipptisch positiv	132 / 2.165	6,10	127 / 2.126	5,97
HV-Zeit spontan pathologisch	66 / 2.165	3,05	75 / 2.126	3,53
HV-Zeit unter Provokation pathologisch	41 / 2.165	1,89	33 / 2.126	1,55
Herzinsuffizienz NYHA				
keine	28.940	46,39	22.466	43,28
Grad I	7.311	11,72	7.129	13,73
Grad II	16.692	26,76	14.833	28,58
Grad III	8.138	13,04	6.541	12,60
Grad IV	1.301	2,09	935	1,80
Schrittmacherabhängigkeit				
(Asystolie von mindestens 4 sec nach Abschalten des SM oder Eigenfrequenz < 40/min)	15.545	24,92	13.019	25,08