

Qualitätsindikator: Perioperative Schlaganfälle oder Tod bei asymptomatischer Karotisstenose I

Qualitätsziel:	Asymptomatische Stenose ohne kontralateralen Befund: Angemessen niedrige Rate an perioperativen Schlaganfällen oder Todesfällen
Grundgesamtheit:	Patienten mit asymptomatischer Karotisstenose mit einem Stenosegrad $\geq 60\%$ (NASCET) ohne kontralateralen Verschluss oder kontralateraler Stenose $\geq 75\%$ (NASCET) unter Ausschluss der Karotischirurgie unter besonderen Bedingungen (Indikationsgruppe C)
Referenzbereich:	< 3%

	Gesamt 2004	
	Anzahl	%
Patienten mit perioperativen Schlaganfällen oder Tod	162 / 9.292	1,74%
Vertrauensbereich		1,49% - 2,03%
Referenzbereich		< 3%
Verstorbene Patienten	38 / 9.292	0,41%

Vorjahresdaten	Gesamt 2003	
	Anzahl	%
Patienten mit perioperativen Schlaganfällen oder Tod	148 / 7.333	2,02%
Vertrauensbereich		1,71% - 2,37%

Verteilung der Krankenhausergebnisse [Diagr. 3]:


Anteil von Patienten mit perioperativen Schlaganfällen oder Tod an Patienten mit asymptomatischer Karotisstenose $\geq 60\%$ (NASCET) ohne kontralateralen Verschluss oder kontralateraler Stenose $\geq 75\%$ (NASCET)

54 Krankenhäuser haben keinen Fall in dieser Grundgesamtheit.


Krankenhäuser mit mindestens 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 8,0%

Median der Krankenhausergebnisse: 0,0%



Krankenhäuser




143 Krankenhäuser haben mindestens 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit.

Krankenhäuser mit weniger als 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 100,0%

Median der Krankenhausergebnisse: 0,0%



Krankenhäuser

296 Krankenhäuser haben weniger als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit.