

Qualitätsindikator: Perioperative Schlaganfälle oder Tod bei asymptomatischer Karotisstenose II

Qualitätsziel:	Asymptomatische Stenose mit kontralateralem Befund: Angemessen niedrige Rate an perioperativen Schlaganfällen oder Todesfällen
Grundgesamtheit:	Patienten mit asymptomatischer Karotisstenose mit einem Stenosegrad $\geq 60\%$ (NASCET) mit kontralateralem Verschluss oder kontralateraler Stenose $\geq 75\%$ (NASCET) unter Ausschluss der Karotischirurgie unter besonderen Bedingungen (Indikationsgruppe C)
Referenzbereich:	< 5%

		Gesamt 2004	
		Anzahl	%
Patienten mit perioperativen Schlaganfällen oder Tod		42 / 1.671	2,51%
Vertrauensbereich			1,82% - 3,38%
Referenzbereich			< 5%
Verstorbene Patienten		17 / 1.671	1,02%

Vorjahresdaten		Gesamt 2003	
		Anzahl	%
Patienten mit perioperativen Schlaganfällen oder Tod		40 / 1.378	2,90%
Vertrauensbereich			2,08% - 3,93%

Verteilung der Krankenhausergebnisse [Diagr. 4]:


Anteil von Patienten mit perioperativen Schlaganfällen oder Tod an Patienten mit asymptomatischer Karotisstenose $\geq 60\%$ (NASCET) mit kontralateralem Verschluss oder kontralateraler Stenose $\geq 75\%$ (NASCET)

155 Krankenhäuser haben keinen Fall in dieser Grundgesamtheit.


Krankenhäuser mit mindestens 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 6,3%

Median der Krankenhausergebnisse: 0,0%



Krankenhäuser




8 Krankenhäuser haben mindestens 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit.

Krankenhäuser mit weniger als 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 100,0%

Median der Krankenhausergebnisse: 0,0%



Krankenhäuser

330 Krankenhäuser haben weniger als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit.